ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN PARA LAS FUERZAS ARMADAS

Vacunas	Indicaciones	Dosis/Esquemas Vía administración	Comentarios
Hepatitis B	Para todo el personal no inmune de las fuerzas armadas (desde el reclutamiento o vinculación)	3 dosis / 20 mcg 0, 1,6 meses o 0,1,2 (+12) meses. Si es Vacuna A+B: 3 dosis I.M Región deltoidea	No se recomienda medición de títulos ni de refuerzos. Niveles de protección: títulos iguales o superiores a 10 UI/L
Influenza	Todo personal de fuerzas militares	1 dosis anual I.M. Región deltoidea	Reduce tanto la transmisión a otros y el desarrollo de brotes
Meningococo	Todo personal en campañas y en campamentos, asignadas a áreas endémicas	Vacuna BC: 2 dosis / 6 - 8 semanas I.M. Región deltoidea Vacuna AC: 1 dosis I.M. Región deltoidea Vacuna A+C+ Y+ W135 conjugada.	Regiones endémicas; vacunación de acuerdo con el serogrupo de meningococo, necesaria en control de brotes
Tétanos-Difteria (T-D) o Tétanos, Difteria y Pertussis (Tdap)	Mantener los esquemas para la población general	Refuerzo c/10 años Td. I.M Región deltoidea	Si se tiene previamente el esquema completo
Hepatitis A	Personal no inmune	2 dosis 0.6-12 meses I.M Región deltoidea	Inmunidad previa por IgG antiHA.
Fiebre Tifoidea	Trabajadores en áreas endémicas	1 dosis I.M. Región deltoidea	Revacunación cada 3 años.
Fiebre amarilla	Trabajadores en áreas endémicas	1 dosis S.C.	Revacunación cada 10 años para las personas que siguen estando en riesgo de tener la enfermedad.
Varicela	Vacunación para todo el personal	1-2 dosis S.C	Control de brotes a partir del día 3 de detección del caso índice
Neumococo	Para el personal de alta montaña	1 dosis: I.M. región deltoidea	Eficaz para enfermedad invasiva por Sp. Neumoniae
Rabia	Trabajadores en áreas endémicas	Preexposición: 3 dosis días 0,7, 21 o 28. Primer refuerzo al año: refuerzos posteriores cada 3 años. Postexposición: 5 dosis los días 0,3,7,14,28. I.M Región deltoidea	De acuerdo con la severidad de la mordedura agregar 20 UI/Kg de peso de inmuno globina antirrábica de origen humano o 40 UI/Kg de suero antirrábico purificado de origen equino
COVID-19	Toda la población	1 o 2 dosis según casa farmacéutica. I.M. Región deltoidea	Refuerzos bajo condiciones especiales