ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN PARA EL SECTOR SALUD

Vacunas	Indicaciones	Dosis/Esquemas vía administración	Comentarios
Hepatitis B	Para todo el personal no inmune (desde el inicio de prácticas de estudiantes)	3 dosis / 20 mcg 0, 1,6 meses o 0,1,2 (+12) meses. Si es VacunaA+B: 3 dosis I.M Región deltoidea	Títulos iguales o superiores a 10 UI/L, son indicativos de seroconversión.
Influenza	Vacunación para todo el personal	1 dosis anual I.M región deltoidea	Reduce tanto la transmisión a otros y el desarrollo de brotes.
Meningococo	Personal de urgencias y que realiza procedimientos invasivos; además exposición en áreas endémicas	Vacuna BC: 2 dosis / 6 - 8 semanas I.M. Región deltoidea Vacuna AC: 1 dosis I.M. Región deltoidea Vacuna A+C+ Y+ W135 conjugada. 1 dosis I.M. Región deltoidea	Regiones endémicas; vacunación de acuerdo con el serogrupo de meningococo, necesaria en control de brotes.
Tétanos - Difteria (TD) o Tétanos, Difteria y Pertussis (Tdap)	Mantener los esquemas para la población general	Refuerzo c/10 años Td. I.M Región deltoidea	Si se tiene previamente el esquema completo.
Hepatitis A	Personal no inmune	2 dosis 0.6-12 meses I.M Región deltoidea	Inmunidad previa por IgG antiHA, No es necesaria de rutina la prueba serológica de IgG.
Fiebre Tifoidea	Trabajadores en áreas endémicas	1 dosis I.M. Región deltoidea	Revacunación cada 3 años
Sarampión, Rubeola y Paperas	Todas las personas que trabajan en sitios de salud incluyendo el cuidado de personas con enfermedad crónica, deben tener adecuada inmunidad contra las tres patologías	Única dosis 0,5 ml S.C.	La vacuna puede ser usada en su aplicación tres días posteriores al contagio para contener un posible brote en TS y en poblaciones no inmunes
Varicela	Vacunación para todo el personal	1-2 dosis S.C.	Control de brotes a partir del día 3 de detección del caso índice
COVID-19	Vacunación para todo el personal	1 o 2 dosis según casa farmacéutica I.M. Región deltoidea	Refuerzos bajo condiciones especiales