

ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN PARA TRABAJADORES DE GANADERÍA, VETERINARIA Y ZOOTECNIA			
Vacunas	Indicaciones	Dosis/Esquemas Vía administración	Comentarios
Hepatitis B	Personal en zonas de riesgo y presencia de virus Delta	3 dosis / 20 mcg 0, 1,6 meses o 0,1,2 (+12) meses. Si es Vacuna A+B: 3 dosis I.M Región deltoidea	No se recomienda medición de títulos ni de refuerzos. Niveles de protección: títulos iguales o superiores a 10 UI/L
Influenza	Todos los trabajadores	1 dosis anual I.M. Región deltoidea	Reduce el ausentismo laboral
Tétanos - Difteria (TD) o Tétanos, Difteria y Pertussis (Tdap)	Mantener los esquemas para la población general	Refuerzo c/10 años Td. I.M Región deltoidea	Si se tiene previamente el esquema completo
Hepatitis A	Personal no inmune	2 dosis 0.6-12 meses I.M Región deltoidea	Inmunidad previa por IgG antiHA, No es necesaria de rutina la prueba serológica de IgG
Fiebre Tifoidea	Trabajadores en áreas endémicas	1 dosis I.M. Región deltoidea.	Revacunación cada 3 años.
Fiebre amarilla	Trabajadores en áreas endémicas	1 dosis S.C.	Revacunación cada 10 años para las personas que siguen estando en riesgo de tener la enfermedad.
Rabia	Trabajadores en áreas endémicas; zootecnistas, veterinarios, empleados de zoológicos, laboratorios y criaderos; viajeros a zonas de rabia endémica	Preexposición: 3 dosis días 0,7, 21 o 28. Primer refuerzo al año: refuerzos posteriores cada 3 años. Postexposición: 5 dosis los días 0,3,7,14,28. I.M Región deltoidea	De acuerdo con la severidad de la mordedura agregar 20 UI/Kg de peso de inmuno globina antirrábica de origen humano o 40 UI/Kg de suero antirrábico purificado de origen equino
Meningococo	En regiones endémicas o con brotes por meningococo	Vacuna B+C: 2 dosis/ 6-8 semanas. Vacuna ACYW: 1 dosis I.M Región deltoidea	Regiones endémicas. Vacunación de acuerdo con el serogrupo de meningococo. Necesaria en control de brotes
COVID-19	Toda la población	1 o 2 dosis según casa farmacéutica. I.M. Región deltoidea	Refuerzos bajo condiciones especiales